DLP 15-9-71 21135.

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SÈVRES, VIENNE

12, rue Victor-Hugo — 86 - POITIERS — Tél. : (49) 41.35.55

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F.
C. C. P. LIMOGES 4.752.22 W.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
12, rue Victor-Hugo - 86 - POITIERS

BULLETIN N° 132 - SEPTEMBRE 1971 - Supplément n° 1.

VIGNE

BLACK-ROT - Vignoble du Haut-Poitou -

Nous rappelons que les attaques sur grappes peuvent se poursuivre après la véraison jusqu'aux vendanges. Les récentes pluies des 9, 10, et 11 septembre - qui ont pu occasionner des contaminations sur les baies - ont entraîné un lessivage des dépôts fongicides antérieurs dans la plupart des secteurs. En conséquence, il convient de renouveler les traitements dans tous les vignobles, dès que possible, de façon à maintenir une protection continue de la récolte.

CICADELLES

Dans certains vignobles des Charentes, l'on observe une progression des attaques de cicadelles. Si les dégâts prenaient trop d'ampleur, il serait utile d'intervenir avec un produit à faible rémanence, de façon à respecter les délais d'emploi avant récolte (cf. Bulletin n° 127 d'avril 1971).

POIRIERS

ANTHONOME

Dans les vergers où des dégâts sont habituellement constatés au printemps (bourgeons floraux ne débourrant ou débourrant anormalement, puis se desséchant), effectuer un traitement avec un produit reconnu efficace (cf. Bulletin n° 126), en respectant strictement les délais d'emploi avant récolte (cf. Bulletin n° 127).

POMMES-DE-TERRE

Dans le Bulletin n° 130, à la rubrique "MILDIOU", le mot "diquat" était suivi de la mention : "à éviter sur les cultures destinées à la production de plants, en raison de phytotoxicité à l'égard des tubercules".

Il est précisé à ce sujet que le brunissement de l'anneau vasculaire que l'on peut observer, en dehors des attaques de verticillium, est vraissemblablement dû à la conjonction d'un certain nombre de facteurs : état physiologique de la plante, dessication du sol, temps chaud et ensoleillé...

C'est ainsi qu'au début de l'été, des pommes-de-terre de variété demi-hâtive présentaient un anneau vasculaire bruni, alors qu'aucun défanant n'avait été utilisé.

L'emploi de tels produits n'aurait fait qu'aggraver un phénomène naturel, pouvant aller jusqu'à la "nécrose du talon".

Il y a donc lieu de prendre certaines précautions pour l'utilisation des défanants. Suivre en particulier les indications fournies par les fabricants, dans leurs notices.

NOTE : Le supplément n° 1 du Bulletin d'Août doit porter la mention : n° 131, et non 132.
De même, le Bulletin de Septembre, le dernier paru, est le n° 132, et non pas 133.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes"
F. BARBOTIN

Les Contrôleurs chargés des
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
R. HUDE - H. BOUE

Imprimé à la Station, le 14 Septembre 1971 - Précédente note : Bulletin n° 132 -

Imprimerie de la Station Poitou Charentes - Directeur-Gérant : L. BOUYX

P53